

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ КОМИТЕТОМ
МИНЗДРАВА РОССИИ
22 февраля 2001г.
ПРОТОКОЛ №26

ИНСТРУКЦИЯ

(ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ)

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

ЖЕЛЧЬ МЕДИЦИНСКАЯ КОНСЕРВИРОВАННАЯ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: Р N002089/01 - 2003 от 23.01.2009

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: эмульсия для наружного применения.

СОСТАВ

1 бутылка содержит:

Активное вещество: желчь крупного рогатого скота и свиней консервированная, замороженная – 900 мл.

Вспомогательные вещества: спирт этиловый ректификованный – 100 мл, формалин – 1 мл, раствор фурацилина в 70% спирте (1:1500) – 10 мл, отдушка – 2 мл.

ОПИСАНИЕ

Жидкость от желто-коричневого до темно-коричневого с зеленоватым оттенком, от светло-зеленого до темно-зеленого с коричневатым оттенком цвета, со специфическим запахом, без осадка или с хлопьевидным (мелко-зернистым) осадком.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Препарат обладает местнораздражающим действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Применяют наружно при артралгиях, посттравматических миалгиях (без нарушения целостности кожи).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Установленная повышенная чувствительность к препарату, нарушения целостности кожи в местах предполагаемого нанесения препарата, заболевания кожи.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не следует применять препарат без консультации врача при беременности, в период кормления грудью и в детском возрасте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Следует избегать попадания препарата на открытые раны, в глаза и другие слизистые оболочки.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Не следует смешивать препарат с другими лекарственными средствами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАРУЖНО!

Препарат применяют в виде компрессов в течение 6-10 дней.

Марлевую салфетку (в 4 – 6 слоев) обильно пропитывают препаратом. Салфетка накладывается на пораженный участок, покрывается вощаной бумагой, тонким слоем ваты и фиксируется легкой повязкой.

Компрессы с желчью консервированной медицинской держатся в течение суток. При высыхании марлевая салфетка увлажняется водой комнатной температуры и вновь фиксируется повязкой.

Через сутки производится смена компрессов с обязательной новой марлевой салфеткой.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

В единичных случаях препарат может вызвать раздражение кожи, которое быстро проходит при отмене препарата. В таких случаях последующее применение компрессов возможно только через 30 дней.

Следует сообщать своему лечащему врачу о всех побочных эффектах.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Усиление побочных эффектов.

ФОРМА ВЫПУСКА

Эмульсия для наружного применения в бутылках по 100 мл и 250 мл.

СРОК ГОДНОСТИ

2,5 года. Не следует использовать препарат с истекшим сроком годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном, защищенном от света месте.

ХРАНИТЬ В МЕСТАХ НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта врача.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Россия, 196158, Санкт-Петербург, Московское ш., 13, ООО «Самсон-Мед».

Тел.: (812) 326-36-44, факс (812) 702-45-91.