

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Департамента  
Государственного контроля  
лекарственных средств и  
медицинской техники  
В.Е.Акимочкин  
25 августа 2003 г.

ОДОБРЕНО  
Фармакологическим  
Комитетом МЗ РФ  
30 мая 2002 г.  
Пр. № 1.

## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

### САМПРОСТ

**Регистрационный номер:** P N001849/02-2003 от 10.09.2008

**Торговое название препарата:** Сампрост

**Лекарственная форма:**

Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения.

**Состав:**

1 флакон содержит 5 мг лиофилизата (препарата полипептидной природы, получаемого путем экстракции ткани простаты быков и бычков, достигших половой зрелости) и 10 мг глицина.

**Описание**

Лиофилизированный порошок или пористая масса, уплотненная в таблетку, белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

**Фармакотерапевтическая группа**

Средство для лечения хронического простатита.

**КОД АТС:** G04BX

**Фармакологическое действие**

Способствует уменьшению отека, лейкоцитарной инфильтрации и тромбоза венул предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает количество лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря.

Уменьшает тромбообразование, обладает антиагрегантной активностью.

### **Показания к применению**

Сампрост применяют у взрослых для лечения хронического простатита и осложнений после операций на предстательной железе.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к препарату.

### **Способ применения и дозы**

Препарат вводят внутримышечно по 5-10 мг один раз в сутки в течение 5-10 дней.

Перед введением препарат растворяют в 1 мл 0,25-0,5% раствора прокаина, раствора натрия хлорида 0,9% или воды для инъекций.

При необходимости проводят повторный курс (через 1-6 месяцев).

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

### **Форма выпуска**

10 флаконов в пачке из картона с инструкцией по применению.

При упаковке с растворителем – 5 флаконов с препаратом и 5 ампул по 2 мл с раствором натрия хлорида изотонического 0,9% в пачке из картона с ножом ампульным или скарификатором и инструкцией по применению.

### **Условия хранения**

В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше +20°C.

### **Срок годности**

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска из аптек**

По рецепту врача.

### **Производитель**

ООО «Самсон-Мед»

196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 13

Тел.: (812) 326-36-44, факс (812) 702-45-91