

## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

### ТИМАЛИН®

**Регистрационный номер:** ЛС-000267 от 29.04.2005.

**Торговое название препарата:** Тималин.

**Лекарственная форма:** лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения.

**Состав:** активное вещество: полипептиды тимуса - 10 мг, вспомогательное вещество: глицин - 20 мг.

**Описание.** Лيوфилизированный порошок или аморфная масса, уплотненная в таблетку, белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** иммуностимулирующее средство.

**Код АТХ L03AX.**

**Фармакологическое действие.** Восстанавливает нарушенную иммунологическую реактивность (регулирует количество и соотношение Т- и В-лимфоцитов и их субпопуляций, стимулирует реакции клеточного иммунитета, усиливает фагоцитоз), стимулирует процессы регенерации и кроветворения в случае их угнетения, а также улучшает течение процессов клеточного метаболизма.

**Показания к применению.** Иммунодефицитные состояния у взрослых и детей (от 6 мес. до 14 лет) при:

- инфекционных гнойных и септических процессах;
- стойких нарушениях функции тимуса (лучевая болезнь, опухоли тимуса, оперативное удаление тимуса);
- острых и хронических вирусных и бактериальных инфекциях;
- нарушении регенеративных процессов;
- угнетении иммунитета и кроветворения после химиотерапии или лучевой терапии у онкологических больных.

**Противопоказания.** Индивидуальная непереносимость, беременность и период лактации.

**Способ применения и дозы.** Содержимое флакона перед инъекцией растворяют в 1-2 мл изотонического раствора натрия хлорида. Препарат вводят внутримышечно ежедневно в следующих дозах: взрослым по 5-20 мг (30-100 мг на курс), детям до года - 1мг; 1-3 года - 1,5-2 мг; 4-6 лет - 2-3 мг; 7-14 лет - 3-5 мг в течение 3-10 дней в зависимости от выраженности нарушений иммунитета. При необходимости проводят повторный курс (через 1-6 месяцев).

С профилактической целью препарат применяют внутримышечно ежедневно, взрослым по 5-10 мг, детям 1-5 мг в течение 3-5 дней.

**Побочные действия.** Аллергические реакции.

**Форма выпуска.** Лيوфилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 10 мг в стеклянных флаконах вместимостью 5 мл. По 10 флаконов помещают в пачку картонную вместе с инструкцией по применению. При упаковке с растворителем по 5 флаконов с препаратом и 5 ампул с растворителем помещают в пачку вместе с ножом ампульным или скарификатором и инструкцией по применению.

**Срок годности.** 3 года. Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения.** В сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей при температуре не выше +20°С.

**Условия отпуска из аптек.** По рецепту.

**Производитель:** ООО "Самсон-Мед", 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 13. Тел. (812) 326-36-44, факс (812) 702-45-91.