

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ЖЕЛЧЬ МЕДИЦИНСКАЯ КОНСЕРВИРОВАННАЯ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Р N 002089/01

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: эмульсия для наружного применения

СОСТАВ:

Активное вещество:

Желчь крупного рогатого скота и
свиней консервированная, замороженная 900 мл

Вспомогательные вещества:

Спирт этиловый ректификованный 100 мл

Формалин 1 мл

Раствор фурацилина в 70 % спирте (1 : 1500) 10 мл

Отдушка 2 мл

ОПИСАНИЕ

Жидкость от желто-коричневого до темно-коричневого цвета с зеленоватым оттенком или от светло-зеленого до темно-зеленого цвета с коричневатым оттенком со специфическим запахом. Возможно наличие осадка.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Препарат обладает местнораздражающим действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Применяют наружно при артралгиях, посттравматических миалгиях (без нарушения целостности кожи).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Установленная повышенная чувствительность к препарату, нарушения целостности кожи в местах предполагаемого нанесения препарата, заболевания кожи.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не следует применять препарат без консультации врача при беременности, в период кормления грудью и в детском возрасте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Следует избегать попадания препарата на открытые раны, в глаза и другие слизистые оболочки.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Не следует смешивать препарат с другими лекарственными средствами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАРУЖНО!

Препарат применяют в виде компрессов в течение 6-10 дней.

Марлевую салфетку (в 4—6 слоев) обильно пропитывают препаратом. Салфетка накладывается на пораженный участок, покрывается вощаной бумагой, тонким слоем ваты и фиксируется легкой повязкой.

Компрессы с желчью консервированной медицинской держатся в течение суток. При высыхании марлевая салфетка увлажняется водой комнатной температуры и вновь фиксируется повязкой.

Через сутки производится смена компрессов с обязательной новой марлевой салфеткой.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

В единичных случаях препарат может вызвать раздражение кожи, которое быстро проходит при отмене препарата. В таких случаях последующее применение компрессов возможно только через 30 дней.

Следует сообщать своему лечащему врачу о всех побочных эффектах.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Усиление побочных эффектов.

ФОРМА ВЫПУСКА

Эмульсия для наружного применения в бутылках по 100 мл и 250 мл.

СРОК ГОДНОСТИ

2,5 года. Не следует использовать препарат с истекшим сроком годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В защищенном от света месте при температуре от 4 до 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта врача

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, НА ИМЯ КОТОРОГО ВЫДАНО РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ/ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ

ООО «Самсон-Мед», Россия

196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13, тел.(812) 326-36-44, факс (812) 702-45-91.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Самсон-Мед», Россия

196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.13, лит. ВА, ВД, ВИ, ВЛ.