

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ЦИТОХРОМ С

Регистрационный номер: ЛП-000631

Торговое наименование: Цитохром С

Группировочное наименование: цитохром С

Лекарственная форма: капли глазные

Состав

1 мл препарата содержит:

Действующее вещество: цитохром С¹ - 2,5 мг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

¹*Получено из сердец крупного рогатого скота, лошадей и свиней.*

Описание

Прозрачная красновато-коричневого цвета жидкость

Фармакотерапевтическая группа

Метаболическое средство

Код АТХ: S01XA

Фармакологические свойства

Метаболическое средство, оказывает антигипоксическое, трофическое действие, стимулирует процессы регенерации. Является катализатором клеточного дыхания.

Фармакодинамика

Механизм действия препарата связан с наличием в простетической группе железа, способного переходить из окисленного состояния в восстановленное. В результате ускоряются эндогенные окислительно-восстановительные реакции и обменные процессы в тканях, улучшается утилизация кислорода.

Фармакокинетика

При местном применении цитохром С не всасывается в системный кровоток, в организме метаболизируется полностью. Распад цитохрома С идет по тем же метаболическим путям, что и расщепление аминокислот, а гем, расщепленный до билирубина, выводится с желчью.

Показания к применению

В составе комплексной терапии при дистрофии роговицы (первичной и вторичной), помутнении роговицы, кератите (в стадии эпителизации).

Противопоказания

Детский возраст до 18 лет. Гиперчувствительность к компонентам препарата. Беременность и период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Местно. По 1-2 капли в конъюнктивальный мешок 3-4 раза в сутки.

Длительность применения препарата в составе комплексной терапии устанавливается лечащим врачом в зависимости от эффективности терапии.

Побочное действие

Аллергические реакции, гиперемия конъюнктивы, кратковременное жжение в глазу.

Передозировка

Данные отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Исследования взаимодействия не проводились.

Особые указания

При использовании других офтальмологических лекарственных препаратов одновременно интервал между их введением должен быть не меньше 10-15 минут.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Пациенты, у которых после закапывания препарата появляется кратковременное жжение глаз, не должны управлять транспортными средствами и механизмами сразу после применения глазных капель.

Форма выпуска

Капли глазные 0,25 %.

По 2 мл во флаконы стеклянные вместимостью 5 мл, укупоренные пробками резиновыми и обкатанные колпачками алюминиевыми.

1 флакон с крышкой-капельницей и инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона коробочного.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 4 до 20 °С.

Вскрытый флакон хранить в холодильнике не более 3-х суток в закрытом виде.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

**Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/
организация, принимающая претензии**

ООО «Самсон-Мед», Россия

196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13, тел. (812) 326-36-44,
факс (812) 702-45-91

Производитель

ООО «Самсон-Мед», Россия